

傷寒論後條辨

傷寒論後條辯卷之十一

新安程應旄郊倩條註

少陰篇

少陰之藏爲腎。雜病或責腎之不足。卒病但責腎之有餘。有餘者水也。寒也。以寒水之藏而居坎北。純是陰氣用事。全賴本經對待之火化其凜冽。以奉生身。而莫熬立極。稱曰陽根。夫根則宜牢固。不宜動搖矣。所嫌水火同宮。制勝終在彼。勢不得不養土作子。裁之且以生之。使坤厚而坎無盈。庶幾水有所畏。而前來抱火。其作根深寧極之宰也。所

先天之炁在
所指陰中之
陽而言中
無陽遂成死

元氣素於
動則化而為
水通之也水
能通者也

以首忌在汗。以他經發汗。只懼其沒水而竭。少
陰經發汗。并懼其升陽而出。焰也。火隨焰升。下焦
乃成水窟。於是土神渙矣。土渙而水無制。始唯下
奔。久乃上逆。寒勢攻冲。頃刻而凌心火。厥竭亡陽。
雖欲溫之。溫已無及。所以歷陳諸死證。蓋以防微。
杜漸。警人以履霜之懼也。究所由來。少陰勝而跌
陽負耳。跌陽之負。火失溫耳。此之謂逆。若欲反逆。
為順。無如補土。補土無如助火。此溫之一法。在少
陰較太陰倍為孔亟也。余條此篇。只以少陰負跌
陽為順一語。作上下文轉軸。上文猶之案也。而以

此語反承作所下文猶之目也。而以此語順揭爲網。上下兩分。而條理秩然矣。或者難予曰。旣已稱爲順矣。何以復有三承氣之證也。余曰。順之爲言。非必其人不病之謂也。亦非必其病平適盡就我藥品藥之謂也。但使證候顯明。無有疑難治法。直捷不致傍撓。則稍黃直裏品視之耳。何進之有其間。只四逆散一證。寒熱未經詳定。姑依小柴胡例。從事和解。然黃本已經羣去。而加減中則依然乾薑。侯無附子。豈仲景於溫之一字。篇中不啻三致意焉。今予一一條出。使人知少陰之有知識人。

之至寶而不可須臾失也。近時薛立齋亦有腎
虛火不生土。腎虛火不歸元等語。似于仲景若
有私淑者。但所主僅金匱中八味丸一左。易之作
湯劑。此祇能于水中補火。非能從火中補土。用之
于雜證或宜。至若卒病之來。自不能不於仲景少
陰篇數千百遍讀之。而得其神且妙也。

少陰之爲病。脉微細。但欲寐也。

少陰腎之經也。其藏柔脆。而夾乎二陰之間。自尔
受寒最深。故其爲病如婦人女子之怯弱。毫無氣
力。而黃蠱蠱或偏多。設假舍脉無從得其證者。是

少陰病六七
日前多寐人
以不覺而起
病者以承運
水者指凡
後而亡陽發
證諸利証便
伏于此也矣
最其隄防

陰脈皆沉。異乎太陽之浮。不必言矣。陽明脈大。微者大之反。少陽脈弦。細者弦之反。沉而有兼。陰證定矣。故前太陰後厥陰。俱不出脈象。以少陰一經。可以該之也。但欲寐者。陰氣盛而無陽邪乘之也。一有陽擾。輒復反。是諸經首條所揭。非證卽病。此只以但欲寐。寫及病證中之情態。緣少陰多假。無真證可揭。彼方欲亂我於證之中。我偏察彼于證之外。此條之但欲寐。合後條之口中和。皆從開淡處。授人以秦鏡。任彼粧妖幻怪。而毫髮難逃。所請觀之於其所忽也。

雖是陰邪從陽而發陽根于陰故表有陰陽裡有少陰

少陰病始得之反發熱麻沉者麻黃附子細辛湯主之

一起病便發熱兼以陰經無汗世醫計日按證則能恣意于麻黃而所忌在附子不知麻沉者由其人腎經素寒雖表中陽邪而裏陽不能協應故沉而不能浮也沉屬少陰不可發汗而始得即發熱屬太陽又不得不發汗須以附子溫經助陽托住其裏使真陽不至隨汗而升其麻黃始可合細辛用耳

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以三

三日無裏症故微發汗也

若前證得之二三日熱仍在表則麻黃勢未可除但減細辛加甘草溫裏却兼和中稍殺麻黃之力可耳病屬少陰即為在裏非少陰內又有裡特陰二三日內發熱外無他證候雖是少陰脈却無少陰證故畧兼太陽例治可見脈一見陰不但證上便要謹慎即日子上亦要謹慎無論腎陽在所顧處即陽病亦見死之凶徵也○按此二條與太陽篇發熱頭痛脈沉用四逆者同一證彼以不差則期過三日可知病已入裏雖尚冒太陽頭痛直以

此乃用以字
誤字推原之
是見鄭氏之

帶及一數
証言沉脈
體凡有
皆從沉
而不可發汗
矣

少陰法。律之。此在初得二三日。雖無頭痛證。不容
意。勿。實。入。少。陰。故。仍。兼。太。陽。律。之。一。出。一。入。不。實
變。書。假。令。前。條。得。之。二。三。日。後。二。條。過。二。三。日。不
差。則。四。逆。之。與。麻。黃。易。地。皆。然。矣。

少陰病。脈細沉數。病為在裏。不可發汗。

何謂之裏。少陰病。脈沉是也。毋論沉細沉數。俱是
藏陰受邪。與表陽是無相干。法當固密腎根。為主
其不可發汗。從脈上斷。非從證上斷。前法不可恃
為常法也。○薛慎菴曰。人知數為熱。不知沉細中
見數。為陽虛。陰寒證。脈常有一息七八至者。蓋

繫此一數字中。但按之無力而散耳。宜深察也。
病人脉陰陽俱緊。反汗出者。亡陽也。此屬少陰。法當
咽痛而復吐利。

所以然者。少陰乃真陽之根。宜秘固不宜宜洩也。
試舉一病言之。陰陽俱緊者。傷寒脉也。法當無汗。
反汗出者何也。由腎陽素虛。一遇寒侵其府藏氣。
輒不能內守而陽亡於外。既已亡陽。雖太陽病亦
屬少陰矣。所以孤陽飛越。則咽痛無陽則陰獨而
復吐利也。然衛上故吐。使其人腎藏素溫。當不
有此。○仲景欲窮究下數條妄汗者。罪歟。夜先出

兩下句義原
此作難也

此一條自汗亡陽者立其案

少陰病。數而下利。譫語者。被火氣劫故也。小便必難。以強責少陰汗也。

如不知腎為真陽之根。而強責其汗。其變有不可勝指者。如少陰病。數而下利。真武中有此證。水冷則金寒耳。何至譫語。知火劫而下寒上燥。亂及神明也。寒祇不能制水。火則偏劫其津。腎成一枯。自之寒肆。小便自難。譫語由火。小便難由火之強責。少陰汗。少陰汗可強發乎。兩兩結出。恐人因譫語。小便難。誤將少陰本病。扯入陽邪內。故重難原之。

熱在外知
無熱近
於指便血
矣

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也

變不止小便難也。藏中真陽逼而盡散于膀胱府。延至八九日肢體盡熱知津竭而血受煎熬。前小便難者至此必便血矣。此謂裏厥表竭。○條中提出八九日字見東隅既失復不能挽之桑榆逼之罪有歸矣。

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治。

然血出下竅猶為逆中之順若少陰病但厥無汗

陽微陰盛可知只從少陰側治之可耳奈何強發之犯所禁乎夫汗釀於營分之血陽氣盛方能釀故陰經無汗總因陽微乃強發之汗疲于供自是通及未曾釀之營血以苦應下厥上竭生氣之源索朕矣難治者下厥非溫不可而上竭則不能用溫故為逆中之逆耳○難治二字追從前之罪也

微弱滿推原少陰不可發汗下之之義

陽微陰盛可知只從少陰側治之可耳奈何強發之犯所禁乎夫汗釀於營分之血陽氣盛方能釀故陰經無汗總因陽微乃強發之汗疲于供自是通及未曾釀之營血以苦應下厥上竭生氣之源索朕矣難治者下厥非溫不可而上竭則不能用溫故為逆中之逆耳○難治二字追從前之罪也

少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱難者復不可下之

總而言之少陰之脉必微必弱必澁微為陽虛澁為汗愈亡其陽陽虛陰血自爾不足故尺脉不弱即

此少陰證不
可下也亡
陽所與太
陰其脈有寒
也同者

二百七十

沉字作少陰
病現成脈看
則溫字非少
陰證外之法
凡六七日諸
實証証誤但
便此處失上
一急字來

泄下之并爾亡陰矣。以此條結上文猶惡書國門。使知入少陰而問禁也。故并帶及復不可下之句。汗詳而下畧者。以少陰多自利證犯之可無易犯也。但枯出尺脈弱瀉字。則少陰之有大承氣湯證。其尺脈必強而滑已伏見於此處矣。

少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯

少陰病禁汗禁下既闢命矣然則主治之法何者為急曰少陰證具但見脈沉便是邪入藏而陰寒用事溫之一法不須遲疑矣四逆湯不必果四逆而後用之也

得者胸中之
用勝生於於
胸中而轉行
於背脊處而
者也

少陰病得之一二日、口中和、其背惡寒者、當灸之、附子湯主之、

且果屬少陰病、溫之不妨、重溫也、其法不必以日拘、但以口中和為驗、故不必惡寒、踰臥等語見也、只背惡寒、便是其候矣、灸之仍主以附子湯、見不妨放手用溫也、○上條出脈不出證、此條出證不出脈、欲人從兩路、突出一少陰病來、故上條只云脈沉、不云脈細、見有此條之口中和、不必定微細也、雖沉數可溫矣、下一急字、破人猶豫耳、

少陰病、下利、脈微、清嘔而汗出、必數更衣、反少者、當

溫其上灸之

汗出已止陽
利心惡汗
後全無汗
衣反不氣
下焦不逆
脫推心及
上焦耳致
其上溫字內
亦可兼溫藥
升陽大補心
麻

三百
七三

溫乎其。所當溫。卽其證有難用溫者。亦不妨設法。溫之。如少陰病下利。陽微可知。乃其脉微而且澁。則不但陽微而陰且竭矣。陽微故陰邪逆上而嘔。陰竭故汗出而勤勞責一法之中。旣欲助陽兼欲護陰。則四逆附子輩俱難用矣。唯灸及頂上百會穴。以溫之。旣可代薑附輩之助陽而行上。更可避薑附輩之辛竄而燥下。故下利可止。究于陰血無傷。可見病在少陰。不可以難用溫。遂棄去溫也。

少陰病吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。

溫法原爲陰寒而設。顧真寒類多假熱。凡陰盛格陽。陰證似陽等。皆少陰中蠱惑人耳目處。須從假處勘出真因。方不爲之牽制。如吐利而見厥冷。是胃陽衰而腎陰併入也。誰不知爲寒者。顧反見煩躁欲死之證。以誰之不知陽被陰拒而置身無地。故有此象。吳茱萸湯扶木力以益火勢。則土得溫而水寒却矣。緣此證全類厥陰。非吳茱萸湯無以蔽其奸也。

少陰病欲吐不吐。心煩但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰也。虛故引水自救。若小便色白者。少陰病形。

悉具小便白者以下集虛有寒不能制水故令色白也

吐利而渴與
積者老則別
在但欲寐且
清者證小便
必不利而亦
也飲水與白
頭翁證同後
曰以有熱故
也小便亦必
不自
腎水久竭則
不能納氣氣

不第此也。人身陰陽中分。下半身屬陰。上半身屬陽。陰盛于下。則陽擾于上。欲吐不吐。心煩證尚模模糊糊。以但欲寐微之。則知下集寒而胸中之陽被壅。治之不急。延至五六日。下寒甚而閉藏微矣。故下利上熱甚。而津液亡矣。故渴虛。故引水自救。非徒釋渴字。指出一虛字來。明其別于三陽證之實邪作渴也。然則此證也。自利為本病。溺白正以徵其寒。故不但煩與渴以寒斷。即從煩渴而悉及少陰。

不。結。元。通。十。
屬。上。故。欲。吐。
不。吐。胃。氣。動。
屬。故。心。煩。

三百
七五

少陰病下利白通湯主之

之熱證。非戴陽。卽格陽。無不可以寒斷。而從溫治。
○煩證。不盡屬少陰。故指出。但欲寐。來。渴證。不盡
屬少陰。故指出。小便白。來。結。以下。焦虛有寒。教人。
上病治在下也。蓋上虛而無陰。以濟。總由下虛而。
無陽以溫。二虛字。皆由寒字得來。

承上言。前證下利。不但與太陰之四逆。革有異。亦。
與本經之真武有異。蓋上之君火表之標陽欲越。
已從湯處露倪。須于溫法中。使之得返。於內。歸於。
源。方爲佳兆。故用四逆加蔥白。易名曰白通湯。其。

陽而陰自消之義也。合之上條，彼是證，此是治。
少陰病下利，脈微者，與白通湯，利不止，厥逆無脈，乾
嘔煩者，白通加豬膽汁湯主之。服湯，脈暴出者死，微
續者生。

乾嘔煩者，寒
氣相拒，陽氣
逆亂也。

白通加豬胆

可見少陰病凡屬陰證似陽之類，俱出失之於五
六日前，至於下利，便自擔差，以陰病屬諸微亡陽
之脈故也。與白通湯利不止，厥逆無脈，乾嘔煩者，
則知陰邪壅盛，熱藥并為寒格，陽欲通而不得通，
致陰陽不相接續，使然耳。用前方加人尿、豬膽汁
為導，從陽引至陰，所謂求諸其屬也。暴出者死，無

升延阿人
東國醫之
始

三百
七七

根之陽驟進諸外也。微續者生。陽氣漸交。陰肯納也。總上三條。共是一證。此條乃出脉并救後之法。首條少陰病形悉具。句即指此條諸見證言。差誤不在下利後。由六七日煎之人。防微失着。致六七日後之人。救逆多憂耳。

少陰病下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脉微欲絕。身反不惡寒。其人面赤色。或腹滿。或乾嘔。或咽痛。或利止。脉不出者。通脉四逆湯主之。其脉即出者愈。

看來少陰病下利。然與他經不作。所下爲清穀。不必言。乃裏寒偏多外熱證。何見裏寒。手足厥逆。脉

三陽非虛
陽下寒而
氣不下通
遂成郁熱
君火之化也

三百
七十八

少陰病下利便膿血者桃花湯主之

微欲絕是也何見外熱身反不惡寒其人面赤
是也究竟熱因寒格無論腹痛乾嘔咽痛皆下利
中格陽一類可以不理即使利止而脈仍前欲絕
不出勿謂裡寒已退輒妄治其外熱也須循四逆
湯例消陰翳于下部但加葱白宣陽氣于上焦使
陽氣通脈亦通而即出為真愈不然少陰下利止
且有頭眩時時自冒之死條在非盡保慶時也

從前諸下利之用溫者以其證盡屬寒也不知病
在少陰即證之挾熱者亦不能棄溫而竟用涼也

坤厚能致方
可與何物而
不與強有溫
則不與也

三百
七十九

下利便膿血
與便膿血有
溫燥之分

卽以便膿血論便膿血而傳自下利是由胃中濕
邪下乘而入於腎也實是腎陽不足不能載土所
以有此石脂塞其下源則水可截乾薑粳米溫補
夫中焦則土可升苟不知此而漫云清絳腎氣之
寒土從水崩而陽氣脫矣
少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止
便膿血者桃花湯主之

抑前證毋論其得之初起也卽二三日至四五日
未可視其爲傳經之熱邪也腹痛而小便不利水
土混淆可知雖是土虛不能制水終是火衰不能

三百八十

旺土。仍主前方。則水得火而能輸。土得火而能燥。苟不知此。而浸云。滲泄。腎防一徹。前後泄利。而陽神陷矣。

少陰病下利。便膿血者。可刺。

或不得已。而疑前方之澁。而助壅。則宜洩之法。不妨輔之以刺。刺僅去經中之熱。而無寒涼。以及藏也。故曰可耳。

少陰病下利。咽痛。胸滿。心煩者。猪膚湯主之。

又以咽痛論。下利雖是陰邪。咽痛實為急候。况兼胸滿。心煩。誰不曰急則治標哉。然究其由來。實是

三百八十一

脈是獨利。無加。而少陰

陰中陽之液從下漏而不能上蒸故有此只宜猪
膚湯潤以滋其土而苦寒在所禁也

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗
湯

若咽痛而不兼下利則自無胸滿心煩之證雖不
由于腎寒上逆然只熱客少陰之標而無開藏本
苦寒則犯本不可用也只宜甘草緩之不差者經
氣阻而不通也加苦梗以開之喻嘉言曰此在二
三日他證未具故用之若五六日則少陰之下利
嘔逆諸證蠱起此法并未可用矣

足少陰之有
咽痛皆下焦
上焦之熱傳
於少陰故不
能言但氣
逆之微甚或
咽乾解渴渴
熱不用苦酒
湯

少陰病咽中痛半夏散及湯主之少陰病咽中傷生
瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

至若咽中痛較咽痛為甚矣甚則似可涼治不知
熱微只屬經苑熱甚反有寒熱不但苦寒不可有
并辛熱不可無半夏散及湯散寒滌飲之不暇
敢犯本乎迨至咽中為痛所傷漸乃生瘡不能語
言聲不出者由從前不知散寒滌飲遂至此雖桂
枝之熱不可有而半夏之辛則難除只從雞子以
潤之苦酒以降之此不但能治標即屬陰火之沸
騰者亦可抑而散矣何嘗于腎本有犯也

胸中實何與
少陰緣下面
之津上逆飲
食未入腹
延格存胸不
得陽以化之
飲食而為是
症曰胸中實
脈乃數脈
為虛則知
是之為虛矣

少陰病、飲食入口即吐、心中溫溫欲吐、復不能吐、始
得之、手足寒、脈弦遲者、此胸中實、不可下也、當吐之、
者、膈上有寒、飲乾嘔者、不可吐也、急溫之、宜四逆湯、
外此而有挾飲者、然病在少陰、亦當從溫以化之、
不能純作飲治也、如飲食入口即吐、業已吐訖矣、
仍復溫溫欲吐、復不能吐、溫溫字與下文寒飲字
對、欲吐復不能吐與下
文乾嘔字此非膈後入之飲食吐之未盡而胸中
對、乾空也、另有物為之格拒也、尚有模糊不妨驗及未飲食
時之證、與脈如始得之、手足寒、脈弦遲者、雖曰陰
邪、然實與虛不同、而虛與實之部位上中下又不

飲食入口即
嘔物盛滿而
上脘也。或
能下利者。盛
滿未去也。

三百
八十五

同。胸中實者。寒物窒塞于胸中。則陽氣不得宣越。所以脈弦遲而非微細者。比手足寒而非四逆者。比飲食入口即吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。皆是物也。寒在胸中。但不可下。而屬實和溫亦被格。但從吐治。一吐而陽氣得通。吐法便是溫法。若膈上有寒。欬乾嘔者。虛寒從下上而阻留。其飲于胸中。究非胸中之病也。直從四逆湯。急溫其下矣。

少陰病二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此為有水氣。其人或欬。或小便利。或下利。或嘔者。真武湯主之。

胃中氣寒水
乃從上此水
即胃中陰氣
所生也經曰
腎者水之府
也氣上者屬
于腎而生水
液也

真武湯之治
欲以停飲
證也此小
者能之治
以停飲與
寒合也

外此而有挾水氣者。然病在少陰。亦只從溫以鎮之。不能驟作水氣治也。緣水氣唯太陽與少陰有之。以二經同司夫水也。病則水氣不散。而為禍因之。加病其水內畜。則腹痛。小便不利。而下利。其水氣外滯。則四肢沉重。而疼痛。其水氣挾寒而上射。與上壅。則欬而或嘔。證與太陽雖無大異。然太陽從表得之。腎臟不宣。而水氣為玄府所遏。故以小青龍發之。少陰由下炎有寒。不能制伏本水。一二日至四五日。客邪得深入。而動其本氣。迷至泛濫。而見前證。緣所由來實是胃陽衰而隄防不及。

也。故用真武湯。濕中鎮水。收攝其陰氣。若用。青龍。則中有麻桂。發動腎中真陽。遂為奔豚。厥逆。不旋踵矣。

少陰病。身體疼。手足寒。骨節痛。脉沉者。附子湯主之。就水氣而例之。則少陰病。凡其稍隣于太陽者。俱不得從太陽治。發動腎中真陽之本矣。如身體痛。手足寒。骨節痛。太陽傷寒。同有此證也。以脉沉辨之。沉屬陰寒。重着所致。裏陰有餘。表陽不足。附子湯主之。溫而兼補助陽氣。以禦陰寒。於所謂脉沉者。急溫之。蓋始終不能異其治也。條中單拈一

此屬少陰之
表一層病經
脉上受寒也
以在陰經則
亦屬裏數也
知無法

三百
八七

利自止者經
之寒已去
此屬中陽氣
未回故仍惡
寒踰臥然手
足溫者陽氣

沉字沉而著也故所見者寒實之證經曰諸痛爲
實是也寒實無假熱證寒虛多假熱證假熱之脈
必兼微弱否亦數而微細欲絕固知脉難假也若
服寒涼反見數大無倫次蓋授之以假具也
少陰病下利若利自止惡寒而踰臥手足溫者可治
合觀從前諸治可見少陰病脉沉者急溫之爲一
大法矣一或當溫不溫其變有不可勝言者然寒
之著也有淺深證之變也有輕重如少陰病下利
而利自止則陰寒亦得下祛而又不致于脫雖有
惡寒踰臥不善之證但使手足溫者陽氣有挽回

蘇勝生陽之
氣不對同也

三百
八八

此證無自利
知陽根未脫
故不必手足
微而自煩之
太陽欲去衣
被之衛陽不
能固以取
此孤陰

三百
八九

之機雖前此失之於溫今可尚溫而救失也

少陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治

少陰病不必盡下利也只惡寒而踈已知入藏深
矣煩而去衣被陽勢尚肯力爭也而得之時與欲
又非虛陽暴脫者比雖前此失之於溫今尚可溫
而救失也

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈
緊反去者為欲解也雖煩下利必自愈

少陰脈緊所云陰常在絕不見陽之診也至七八
日自下利寒之入藏者似加深也然脈於利後頓

少陰七八日
之下利脈微

亡陽此以厥
陽為腎受各
寒非本藏則
當發汗手足
反冷此陽可
救也下出
也少陰受其
水脈非諸侯
亡陽之兆手
足溫者二百
街運利九十
後也

亡利幾于上
下交得環

傷寒論後條辨

變。緊。而。為。微。手。足。于。利。後。反。不。冷。而。為。溫。則。微。非。
諸。微。亡。陽。之。微。而。緊。去。入。安。之。微。蓋。以。從。前。之。寒。
已。從。下。利。而。去。故。陽。氣。得。回。而。欲。解。也。雖。煩。下。利。
必。自。愈。緣。寒。之。入。腎。者。未。深。故。前。此。雖。失。之。於。溫。
今。雖。不。溫。而。可。燒。偉。也。

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者
灸少陰七壯

少陰病吐而且利裏陰勝矣以胃陽不衰故手足
不逆冷夫手足逆冷之發熱為腎陽外脫手足不
逆冷之發熱為衛陽外持前不發熱今反發熱自

中之氣不
明則陰氣可
從經往去不
宜發熱者于
此反宜也脉
不至者陽方
外何裡氣不
應也得火力
而氣復上下
無不充周矣

陽受氣於四
肢雖主於脾
意謂中生陽
若氣所聚故

三百九十一

非死候。人多以其脉之不至而委棄之。失仁人之
心與術矣。不知脉之不至。由吐利而陰陽不相接
續。非脉絕之比。灸少陰七壯。治從急也。嗣是而用
藥。自當從事于溫。苟不知此而妄攻其熱。則必死。
不攻而坐視。以失圖維。則不死亦死。吾願人當知
人命為重也。

少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治

諸可治之證。以陰寒雖勝而火種猶存。着意熨煖。
尚堪續煖。倘令陽根漸盡。一錢無餘。縱爾安能。何
從覓燧。所以少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者。

千金要方
卷之四
少陰篇

三百
九二

三百
九二

不○治○有○陰○無○陽○故○也○雖○有○仁○人○之○心○與○術○徒○付○之○
無○可○奈○何○使○早○知○助○陽○而○抑○陰○也○寧○至○此○乎○

少陰病吐利躁煩四逆者死

由○吐○利○而○躁○煩○陰○陽○離○脫○而○擾○亂○可○知○加○之○四○逆○
胃○陽○絕○矣○不○死○何○待○使○蚤○知○溫○中○而○緩○土○也○寧○有○
此○乎○此○與○吳○茱○萸○湯○證○只○從○躁○逆○先○後○上○辯○一○
則○陰○中○尚○現○陽○神○一○則○陽○盡○唯○存○陰○魄○耳○

少陰病目逆惡寒而身踈脉不至不煩而躁者死
諸○陰○邪○具○見○而○脉○又○不○至○陽○先○絕○矣○不○煩○而○躁○陰○
無○陽○附○亦○且○盡○也○經○云○陰○氣○者○靜○則○神○藏○躁○則○消○

亡○蓋○躁○則○陰○藏○之○神○外○亡○也○亡○則○死○矣○使○早○知○復○
脈○而○通○陽○也○寧○有○此○乎○

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

下○利○止○而○頭○眩○時○時○自○冒○者○腎○氣○通○于○腦○也○語○云○
黃○河○之○水○天○上○來○陰○津○竭○于○下○知○橫○游○枯○于○上○也○
前○此○非○無○當○溫○其○上○之○法○惜○乎○用○之○不○預○也○無○及○
矣○

少陰病六七日息高者死

夫○肺○主○氣○而○腎○為○生○氣○之○源○蓋○呼○吸○之○門○也○關○係○
人○之○生○死○者○最○鉅○息○高○者○生○氣○已○絕○于○下○而○不○復○

此則也。吸。納。日。辰。連。經。則。生。此。以。六。七。日。証。邪。已。轉。裏。也。

三百九十六

納。故。游。息。僅。呼。于。上。而。無。所。吸。也。死。雖。成。于。六。七。日。之。後。而。機。自。兆。于。六。七。日。之。前。既。值。少。陰。受。病。何。不。預。為。固。護。預。為。隄。防。迨。今。真。陽。煥。散。走。而。莫。追。誰。任。殺。人。之。咎。凡。條。中。首。既。諄。諄。禁。汗。繼。即。急。重。溫。無。非。見。及。此。耳。今。則。死。證。班。班。未。知。讀。夫。論。者。能。增。其。臨。深。履。薄。之。懼。否。也。

少。陰。病。脉。微。沉。細。但。欲。臥。汗。出。不。煩。自。欲。吐。至。五。六。日。自。利。復。煩。躁。不。得。臥。寐。者。死。

以。今。時。之。弊。論。之。有。不。至。于。惡。寒。踰。臥。四。肢。逆。冷。等。證。叠。見。則。不。敢。溫。嗟。乎。證。已。到。此。溫。之。何。及。哉。

此諸證有至不一見者則蓋于本論中要旨一
申詳之少陰病脈必沉而微細論中首揭此蓋已
示人以可溫之脈矣少陰病得欲以論中首揭此
蓋已示人以可溫之證矣汗出在陽經不可溫而
在少陰宜急溫論中蓋已示人以亡陽之故矣况
復有口中和之證如所謂不煩自欲吐者以互之
少陰中之真證不過如此其餘一皆確證不足覆
也此時邪亦僅在少陰之經未遽入厥而成死證
也然堅冰之至稍一審視則真武四逆誠不啻三
年之艾矣不此綱繆延至五六日在經之邪遂爾

此諸證有至不一見者則蓋于本論中要旨一
申詳之少陰病脈必沉而微細論中首揭此蓋已
示人以可溫之脈矣少陰病得欲以論中首揭此
蓋已示人以可溫之證矣汗出在陽經不可溫而
在少陰宜急溫論中蓋已示人以亡陽之故矣况
復有口中和之證如所謂不煩自欲吐者以互之
少陰中之真證不過如此其餘一皆確證不足覆
也此時邪亦僅在少陰之經未遽入厥而成死證
也然堅冰之至稍一審視則真武四逆誠不啻三
年之艾矣不此綱繆延至五六日在經之邪遂爾

入藏前欲吐。今且利矣。前不煩。今煩。且躁矣。前欲臥。今不得臥矣。陽虛已脫。陰虛轉加。其人死矣。醫者尚不知爲何病。或曰陽證見陰脈宜死。或曰陰陽兩感不治。抑或曰此傳經熱邪。前此失下。而成不治之壞病。倘有一人語之以少陰失溫。必且曰然。曰其人不乎。是厥冷。不惡寒。躁臥。而且煩躁。如是。不得臥。如是。何陰證之有。子亥天噫嘻。吾見其人矣。吾聞其語矣。因悟仲景一片婆心。歷歷諸死證。蓋不啻與尸以諫也。

少陰負跌陽者爲順也。

昔人謂補腎
 不如補脾蓋
 足及此也夫
 行則補脾不
 如補腎者其
 補其也每
 有火也何後
 人以他腎二
 字遂開此病
 陰一門滋陰
 自是陽反
 順急也由不
 東於子仲地
 耳
 九八

此條反以承上順以起下乃一篇之關鍵少陰諸
 死證皆由失之於溫溫者補火以盛土使土氣蒸
 育恒操其勝筭而作鎮中州則水寒却而成溫泉
 不但免夫沈溫之虞而熱腐水殺充膚澤毛皆賴
 之矣唯不知此而失之於溫則跌陽負而少陰乃
 勝水寒互勝以無所畏而上凌心火並陽候爾滅
 沒逆莫大焉知跌陽負少陰之為逆則知少陰負
 跌陽之為順矣

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣

湯

九九

少陰荷負跌陽則亦有少陰負跌陽之病然而不
足虞也有如口中和者少陰溢也二三日而口燥
咽乾便見陽明之證知少陰之負跌陽矣是為土
氣有餘有餘者可瀉大承氣湯不似陽明經之尚
多顧慮也

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下
之宜大承氣湯

又如自利清水色純青似屬陰邪用事矣其人心
下必痛乃土來心下水自溜而殺自利也以口中
和之少陰變為口乾燥之陽明知少陰之負跌陽

自利清水無
色純青

九九

矣。治可同前。不必濡瀝也。

少陰病六七日。腹脹不大便者。急下之。宜大承氣湯。至于六七日。腹脹不大便是少陰轉屬陽明之候。少陰發熱。陽諱矣。證甚顯明。知一下之外。無餘事。誠莫便捷于大承氣矣。何所顧忌而不宜之也。此三證自是陽明病。欲以脈沉匿入少陰中。故仲景便于少陰中用陽明法。使其匿無所匿。知賊臣不以出疆免也。

少陰病得之二三日以上。心中煩不得臥。黃連阿膠湯主之。

病始者言中
 者有燥邪也
 燥則生熱故
 使少陰病使
 覺火土氣勝
 陰病不能上
 於於也治以
 苦寒以瀉陽
 益陰也治以
 右大之下陰
 精水之也

一四

三大承氣證乃少陰有。跌陽之甚者。因下其所當
 下。不為逆也。若負雖不甚。亦必見出跌陽之證。不
 至于誤益陽明之病。不得眠與少陰之但欲寐者。
 自反少陰二三日以上。心中煩而有此。知土核母
 邪以乘水。是亦少陰負。跌陽之類也。治用芩連瀉
 土母之熱。芍藥阿膠。雞黃。濟陰而潤其燥。火土潤
 而腎水寧矣。不得眠者。口中自不和。口乾燥者。
 自必但欲臥而腹脹不大便者。蓋可知矣。因知上
 下皆互文也。

少陰病下利六七日。欬而嘔。渴心煩不得眠者。猪苓

湯主之、

少陰陽虛之
不與陽邪之
推形中者
火在上皆野
中氣陽之氣
也隨其氣而
為之珠白易
以氣在中水
氣在中水
從新運時

又就不得眠之證而推之。下利似乎陰勝矣。即六
七日。欬。嘔。渴。煩。亦尚與少陽模糊。唯微之不得眠。
知濕土攔截中焦。致水不上升。而火不下降。猶少
少陰。負跌陽者類也。治用猪苓湯。分清降濁。土濕
流而水火濟矣。此證以下利作主。五苓散宜亦可
用。乃用猪苓湯者。以猪苓湯為陽明經藥。故仍以
之抑跌陽而濟少陰也。○凡論中着日子處。俱有
深思。不得草草讀過。就少陰一篇合言之。三百六
十二條。三百六十三條。云。如得之。及得之。二三日。

膠清而反四
逆氣和而解
陰病見陽者
有明陰之義
其詳經未詳
作此助文何
難哉乃有餘
也

傷寒論後條辨

者重在日子也。見初得二三日，不得不發汗也。
三百七十一條云：得之一二日，又所以緯此條之
意見。見少陰病不可泥定初得二三日，便宜發汗。若
微見裏證，雖一二日自以溫法為正也。三百七十
九條云：二日至四五日者，輕在日子也。見不拘
其二三日及四五日，而見下利、便膿血，只宜溫也。
三百八十二條云：二三日雖不同證，亦可以緯此
條之意。見少陰病如咽痛之用甘草湯，只可用之。
二三日上過此則不宜也。三百八十五條云：二三
日不已至四五日，及四百二條云：六七日皆紀日。

子之過也。水氣及嘔渴欬煩諸證，曰日子瀝綿而
成也。三百八十九條云七八日者，錄日子之功也。
寒邪襲日子久遠，不能持而自解也。三百七十四
條云五六日者，從前病而例後病也。前之心煩則
兼但寒，後之渴而引水則兼小便白，寒熱不固。
日子而變易也。三百八十四條云始得之者，從後
病而審及前病也。因後病有些模糊，溯前病之證
與脉而實虛自辨也。三百九十八條云二三日者
急之之詞也，病見於倉猝，不妨治以倉猝也。四百
條云六七日者，緩之之詞也，病欲為盈滿，不妨待。

其盈滿也三百六十七條云八九日者計日以責
醫也何前此之玩愒而不知救誤也三百九十五
條云六七日三百九十六條云五六日者責之之
甚也玩愒而至千死以殺人律之宜反坐也四百
一條云得之二三日以上者著日之異以別病之
同欲醫人準此而慎乎毫釐千里之間毋齒芥而
輕人命也緣三百九十六條有煩躁不得眠爲死
證却在五六日之後而五六日前原不煩原但欲
寐故以得之二三日以上別之見起病時便心煩
不得臥與彼條變成者大相懸絕醫者不可不詳

祭也。卽仲景經日之法。細細求之。何啻孔子春王
正月之書。稍一檢點。便覺無限雲日。風霜繁繞于
字句之上。註家一遇二三日。卽云傳邪尚淺。一遇
七八日。卽云傳邪已深。傳會成說。無所不至。正如
鄉人仰月。隨之盈虧。以計朔望。不復知盈虧中。自
有二十四氣。概爲倚伏也。余甚惜夫讀傷寒論者。
終日吟哦。終日考核。仍未免糊塗日子。虛度光陰
也。

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛
或泄利下重者四逆散主之

證同真武而
 不作水氣治
 者此中可升
 有平之土
 能行化氣
 此四因通由
 以氣從五之
 以氣從五之
 以上中下三
 節

至若少陰不甚負跌陽亦不甚勝則溫固難用
 亦難從只從中治為解散亦少陰之一法也初得
 之四逆固非熱證亦非深寒欬悸而或小便不利
 既似乎水畜腹滿泄利又似乎寒凝其中更兼下
 重一證得辨氣滯在跌陽而經絡失宣通也雖四
 逆散於升降降濁中兼有益陰之義然大旨只在
 疏跌陽之滯而經證加減則仍從直武湯例抑陰
 而助陽蓋不欲少陰勝而跌陽負也據此而少陰
 之有溫不可識乎豈唯少陰推之太陰厥陰亦何
 莫非此義余願同志此事者須掃去胸中傳經為

熱之宿見方于仲景之牆不致面而立也

少陰中風。脉陽微陰浮者爲欲愈。

少陰中風。與大陰不甚異。在太陰爲土。得陽和在。少陰爲春風。解陳。故雖陽微如故。而陰脉從下欲起。已卜邪從外向矣。

少陰病欲解時。從子至寅上。

腎中之生陽在子。而丑中有土。寅中有火。陰翳須從此爲開泰也。

傷寒論後條辯卷之十二

一名直解

新安程應旌郊倩條註

辯厥陰病脉証篇

厥陰在三陰爲盡者極也。物極則反。故肝雖陰藏而木中寔胎火氣。非若少陰純以陰寒主令也。然少陰卽厥陰母家。未有母寒而子不受母氣者。故厥陰之寒屬腎陰所移者居多。陰寒盛于下則所胎之火氣就子而發現。木火通明。此火殊屬真火。非若少陰之純假也。故有時可以潛伏。可以芽

厥陰木中有
火此火爲陰

火故有時而
下有時而上
展為陰陽氣
下行極而上
則強然矣然
為陽陽氣上
行極而下則
又展為陰和
之謂

折○特○以○陰○下○而○陽○上○陰○陽○有○不○相○順○接○之○處○所○以○
勝○復○之○間○大○伏○殺○機○以○水○能○剋○火○而○添○木○更○不○能○
助○其○焰○也○一○見○厥○證○便○宜○消○息○圖○雖○但○厥○陰○乃○六○
經○中○之○一○經○而○厥○證○則○諸○證○中○之○一○證○盡○以○厥○證○
入○之○厥○陰○則○虛○寒○雜○證○皆○得○以○紫○亂○朱○而○頭○緒○紛○
多○連○成○亂○絲○矣○故○余○條○此○篇○首○以○不○可○下○為○禁○卽○
繼○之○以○可○下○取○溫○而○上○取○涼○卽○烏○梅○丸○之○用○苓○
連○亦○此○義○也○溫○涼○有○法○則○陰○陽○不○相○順○接○之○厥○治○
之○自○爾○絲○絲○入○扣○縱○有○攔○入○厥○陰○之○證○不○妨○以○本○
證○為○經○而○以○雜○證○作○緯○有○綱○有○目○條○理○秩○然○矣○所○

厥陰為乙木
性宜沉水
有大沉則火
下抱而腎水
溫升則火土
據而腎水寒
故氣上憤心
一何消渴山

以下利嘔噦三項、僅以其餘及之、從來繁聲競響、
雜亂無如厥陰篇、一經條辯而金聲玉振、殊覺正
始之音、尚可敲而可受也、

厥陰之為病、消渴、氣上撞心、心中疼熱、饑而不欲食、
食則吐蚘、下之利不止、

厥陰者、兩陰交盡、陰之極也、極則逆、逆固厥、其病
多、自下而上、所以厥陰受寒、則雷龍之火、逆而上
奔、撞心而動心、心火受觸、則上焦俱擾、是以消
渴而心煩、疼胃虛而不能食也、食則吐蚘、則胃中
自冷可知、以此句結前證、見為厥陰自病之寒、非

之心。中。其。熱。故。也。合。陽。之。氣。就。亦。由。之。而。不。能。合。陽。也。此。氣。乃。太。氣。所。熱。二。字。與。此。一。氣。為。陰。復。

不。得。小。其。火。自。沉。沉。則。皆。水。溫。矣。

傷寒論後條辨

卷之十一

十一

傳熱也。且以見身。身。為。厥。陰。之。主。方。不。但。治。其。宜。之。蓋。肝。脉。中。行。通。心。肺。上。嶺。故。無。自。見。之。證。見。之。中。上。二。焦。其。厥。利。發。熱。時。厥。陰。之。本。證。胃。虛。寒。下。之。則。上。熱。未。除。下。寒。益。甚。故。利。不。止。

厥陰病欲飲水者少少與之愈。

但厥陰之見上熱由陰極於下而陽阻於上陰陽不相親接使然非少陰水來剋火亡陽於外者此寒涼不可化下集而不妨濟上集飲水者少少與之使陽神得以下通而復不犯及中下三焦此陰陽交接之一法也。

凡厥者陰陽不相順接便為厥厥者手足逆冷是也
諸四逆厥者不可下之虛家亦然

厥陰為病
凡厥者
木中有火
熱字誤
厥為熱
經氣為
觀便為三字
此厥字為厥
陰之厥非厥

以首條之誤下而利不止及次條之與水則愈合
觀之陰在下而陽在上可得厥陰經之大旨矣故
要緊在厥之一字不可不分疏明白先提其大綱
而後細分其節目也人惟陽得下行以接乎陰則
陰中有陽而無歇證唯陰得上行以接乎陽則陽
中有陰而無發熱證此之謂順今之所云厥者心
肺之陽祇主其陽於上肝腎之陰祇主其陰於下
兩者不相承接唯視其勝復以為寒熱發熱為陽

冷及諸家之
厥也。

陰陽不相順
接之厥逆曰
陰陽不相順
接也。

此從之語也
手足逆冷之
厥。

此中氣衰
下注清其

此經絡氣
此經絡氣

此經絡氣
此經絡氣

此經絡氣
此經絡氣

此經絡氣
此經絡氣

傷寒論後條

厥逆為陰。不言發熱。單言厥者。厥為重也。此陰陽
不相接續之病。厥陰之稱為厥者。即此便是。非盡
手足逆冷。方謂之厥也。至于陰寒發厥。則專主于
四肢逆冷。即下文所謂有陰無陽者是。此少陰之
病。即厥陰有此。亦屬少陰移來。固另是一厥。非陰
陽不相接續之厥也。二項而外。更多雜證。發厥者
諸四逆。如脈促而厥。脈滑而厥。脈乍緊而厥。亡下
悸而厥。咽喉不利而厥。此又一厥也。在陰陽不相
順接之厥。可酌量乎厥應下之之條。而手足逆冷
之厥。人皆知從事於溫。而亦無下之之誤。獨諸四

下則為地此
之謂也。四
通厥者。注云
氣多少。逆者
為厥之謂也。

逆○之○厥○扶○寒○者○少○。扶○熨○而○為○邪○所○乘○者○多○。不○無○可○
下○之○疑○似○。不○知○病○在○厥○陰○之○寒○藏○。終○是○寒○主○而○熨○
客○。雖○可○下○而○不○可○下○也○。外○是○則○有○虛○家○。雖○其○間○有○
發○厥○者○。有○不○發○厥○者○。而○不○可○下○。則○亦○同○於○諸○四○逆○
厥○者○何○也○。蓋○虛○在○厥○陰○多○。血○少○而○熨○。否○則○寒○濕○
血○而○為○冷○。結○此○等○虛○家○。多○有○五○六○日○不○大○便○者○。故○
以○為○亦○不○可○下○也○。明○此○四○者○之○證○。而○一○分○疏○之○
治○法○。明○如○列○眉○矣○。

傷寒一二日至四五日而厥者。必發熱。前熱者後必
厥。厥深者熱亦深。厥微者熱亦微。厥應下之。而反發

汗者必口傷爛赤

醫藥而厚、
自利、此由
木氣、氣逆
得後其勝、
雖下焦之氣
亦從上焦之
熱所透、故不
勝而不發、
復陽則陰外
是為熱厥、
陰厥為陰中
之陰、陽厥為
陰中之陽、
之通其
也、在夫

請以陰陽不相順接之厥言之。傷寒毋論一二日
至四五日而見厥者。必從發熱得之。熱在前厥在
後。此為熱厥。不但此也。他證發熱時不復厥。發厥
時不復熱。蓋陰陽互為勝復也。唯此證孤陽操其
勝勢。厥自厥。熱仍熱。厥深則發熱亦深。厥微則發
熱亦微。而發熱中兼夾煩渴不下利之裏證。總由
陽陷于內。蕙其陰於外。而不相接也。須用破陽行
陰之法。下其熱。而使陰氣得伸。逆者順矣。不知此
而反發汗。是徒從一二日及發熱上起見。認為表

其熱不在
 經絡而
 熱入
 於內
 則中津液
 愈竭而熱
 得亡
 傷燥亦此熱
 為陰熱無與
 于其故論一
 二日不可汗
 而可下
 熱入逆則
 五藏不平
 府閉塞之所
 生也故能下
 之藥是也
 熱是也

寒故也。不知熱得辛溫而助其升散，厥與熱兩不
 除，而早口傷爛赤矣。○一友云：厥應下之下之為
 言泄也，不指定承氣言，故不出方。肝屬陰而惡燥，
 凡酸鹹潤下之品，亦陽之泄也。此說非不可從。然
 細思之，仲景於厥陰篇無一條無方者，其所不出
 者，皆有所伏，而欲人互得之也。豈於下之之條，欲
 人另自融會，當不其然。下利譌語條，小承氣湯一
 方，在陽明原為和劑，以減去芒硝，祇是下和熱，非
 下胃寔則裏有和熱者，何不可互而用也。

傷寒脈微而厥，至七八日膚冷，其人躁無暫安時者，

此爲藏厥、非爲虵厥也。虵厥者、其人當吐、虵令病者、靜而復時煩、此爲藏寒。虵上入其膈、故煩、須臾復止、得食而嘔、又煩者、虵聞食臭出、其人當得吐、虵虵厥者、烏梅丸主之、又主久利方。

至若寒厥則有之與陰陽不相順接之厥不俾請
先形容之使人知所辨別也厥微而厥純陰之象
微于脈矣至七八日尚自厥冷無陽之象微于形
矣陰極則發躁無復陽援是以擾亂無暫安時也
此自是少陰藏厥爲不治之證厥陰中無此也
于吐衄爲厥陰本證則吐厥可與陰陽不相順接

也。胃氣者
 陽當復而不
 能復此脈證
 也。言此脈而
 先之以瀉瀉
 者不違此
 形彼見此脈
 雖曰寒厥其
 陽脈之有陽
 無陽在陽陽
 不相順接外
 者不可同日
 語也。脈微非
 是其陽利也
 有陰陽無腎
 安時其脈利
 也。
 唐容甫語

者連類而推也。煩則非躁、須臾復止、則非無暫安
 時、祇因脾藏受寒、虢不能安、故因胃中陽氣而上
 逆、始而入脘、則煩、繼而聞食、則嘔且吐也。陰陽錯
 雜、則亦不接、所以見厥較之上條、此為孤陰、擇其
 陽勢、易梅丸破陰、以行陽、於酸辛入肝藥中、微加
 苦寒、統逆上之邪陽、而順之使下也。名曰安虢、蓋
 是安胃、故并主久利、見陰陽不相順接、厥而下利
 之證、皆可以此方括之也。○前條出厥、應下之之
 治、而施一試汗、口傷爛赤之證、來蓋為下文喉中
 痛、便膿血、發痲、腹等證、張本、見無非應下之證也。

醫方字新
厥成於陰陽
不相順接焉
傷九之治不
通使陰陽各
還其位耳大
法是用溫其
加苦寒者乃
此

尤恐人岐之爲二故下文復有便膿血者其喉不
痺之示此條出烏梅丸方而久利之治來蓋
爲下文厥利證張本見無非烏梅丸之治也尤恐
人該括不來故下文復有發熱而利者必自止見
厥復利之示此等開書處非細細讀之孰領其神
聖工巧於無方無外哉

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能
食今反能食者恐爲除中食以索餅不發熱者知胃
氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後二日靜之其
熱續在者期之且日夜半愈所以然者本發熱六日

自利耳
 熱處則但多
 而黃少陰
 亦少利少陰
 向者脈沉遲
 下利者脈沉
 等語證白淫
 則氣上持心
 小者數凡前
 則少陰而沉
 起陰陽之反
 非從大陽也
 自利者利字

厥反九日復發熱三日并前六日亦為九日與厥相
 應故期之旦日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不
 罷者此為熱氣有餘必發瘧也

打破藏厥虵厥疑開則陰陽不相順接之厥可知
 及之矣如傷寒始發熱六日脈必數而陽勝可知
 厥反九日而利不復發熱可知蓋陽極而陰氣來
 復且勝也此九日內當不能食今反能食者恐為
 除中食以索餅不發熱者自是胃陽在內消磨水
 穀中氣尚在故可懸斷其愈但愈必候證熱恐熱
 來而復去與九日之厥期不相應猶非真愈後三

胃氣二十三
陰陽主、

大抵陽氣有
陰陽之分
血虛由
傷也

日脈之而數脈尚在知其熱必不去可與之共愈
期矣雖熱有首尾而計日不差亦謂之陰陽平等
故愈愈後仍脈數仍發熱此邪陽反勝而陰血必
傷厥應下之之法可用於此三日內矣不知下而
致熱氣留連于肉腠則瘴濃之發必不免耳

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯微其熱脈遲為寒
今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能
食此名除中必死

遲為寒對前條看則發厥而利可知六七日陽氣
勝而欲復厥去而發熱矣此時祇宜保護微陽以

成明者有
 行通下中石
 陰陽不調寒
 而燥助水成
 火發燥傷燥
 邪由濕寒熱
 者切忌
 厥陰之有清
 濁陰中同一
 病和者下寒
 而上熱也胃
 氣在陽分則
 為陰也

待其來復奈何反與黃芩湯徹其熱以脉遲之寒
 證投黃芩湯之寒藥胃冷不能納食是其常也此
 證急用烏梅丸尚有可溫一法以之破陰而行陽
 若反能食對上文看則食入必發熱可知是乃中
 氣已為寒藥華去盡徹其熱於身之外膈之上故
 食不待入胃而成膈消也胃陽華職此名除中無
 復望陽之能順接乎陰矣必見發熱下利厥逆發
 躁等證而知○上條脉數此條脉遲是題中二眼
 目

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利

陽勝則陽伏、
一吐陰邪用
事故厥陽復
者陰伏一單
病和用事故
發熱即四百
十九條之進
退字也

七之陽厥利
之熱等上條

厥則必利身不發熱可知此陽微而陰氣勝也屬
烏梅丸證服之自當發熱發熱而利必自止此陽
復也但微陽初復尤須保護俟與厥期平應方是
愈期方可罷手不知此而或因利止輒復因循否
更因發熱而或如前條反以黃芩湯撤其熱於是
見厥而復利陽氣退而病進不無加危矣
傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者
其喉為痺

先厥後發熱下利必自止如前條之證者此一定
之局也其見厥復利者則以應之不及而成變局

津不到於故其味苦燥其熱氣勝也與少陰之咽痛價爲經脈所轉者不同只從下利利止後觀之寒熱殊因矣

然既有應之不及之變局卽自宜應之太過之變局矣利止後而反汗出咽中痛者得無辛溫過劑以致陽熱太勝而鬱蒸也甚局既變則應者隨變不妨斟酌乎厥應下之之法矣苟不知此則發勢散漫而加劇其喉必痺乃成急候發熱無汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉不痺

前證之成變局者以兩局對待而爲變局然既有兩局對待之變局卽有一局相因之變局矣如前證之汗出咽中痛者得之發熱利止後而然也抑

血者其脈不
解其脈之
然於此一氣
為勝從者
此一氣為升
降而因本中
行火此氣遂
為中之陽

陽受風氣故
為喉痺陰受
溫氣故為便
膿血

陽寒論後條辨
或利不有止則祇以發熱無汗為徵驗發熱汗出
而下利尚有亡陽之疑似今則發熱無汗而利不
止知為陽勝而協熱利也。碁局雖變而厥應下之
之應者不必變也。苟不知此則熱勢浸淫而益燥
必便膿血而休息無已時矣。便膿血者其喉不痺
可見二證總是一證。便膿血者不必清腸喉痺者
不必涼膈祇此厥應下之之治前已失之於當機
今尚圖之於事後乎。○以上三條熱則利止厥則
復利是題中二眼印。利止汗出無汗利不止是題
中二眼印。

傷寒熱少厥微指頭寒、嘿嘿不飲食、煩燥數日、小便利、色白者、此熱除也、欲得食、其病爲愈、若厥而嘔、腹脹煩滿者、其後必便血、

其病爲愈則
熱退即愈不
關其濕痰微
熱微利也其
後便膿血者
不寒而微腹
微熱微利也

熱既少厥微而偉指頭寒雖屬熱厥之輕者然然
與厥並現實與首條厥微熱亦微者同爲熱厥之
例故陰陽勝復難以揣摩但以嘔嘔不欲食煩燥
定爲陽勝不飲食似屬寒小便利色白欲得食定
爲陰復蓋陰陽不甚在熱厥上顯出者若此證熱
雖少而厥則不佳指頭寒且不但然然不欲食而
加之嘔不但煩燥而加之胸膈滿則自是厥深熱

外見脈證
已得熱尤
宜其得
不為發復

亦深之極也。發熱者不能自復，必須下之，而以被陽行陰為事。夫有不知此而議救於便血之後，不已晚乎。此條下半截曰：小便利，色白，則上半截小便短，色赤，可知是題中二眼目。嘿嘿不欲食，欲得食，是二眼目。胸膈滿煩燥，與熱除，是二眼目。熱字包有煩燥等證，非專指發熱之熱也。

傷寒厥五日，熱亦五日，設六日當復厥，不厥者自愈。厥終不過五日，以熱五日，故知自愈。

合而斷之，總期乎陰陽平復，方能順接。凡證候之勝復，治法之進退，一準乎此。條中五日子，不以外拘。

此下與前同
已在此後
亦不須論元
不是放熱付
之不理一任
病氣兩項之

陽氣復得之
太過必候
後所用陰平

發與厥大約以日準日等氣平而不加厥則陰陽
已和順矣末三句即上句註脚云自愈者見厥發
已平其他些小之別證舉不足言矣○此條兩五
日字是題中二眼具

傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病
當愈四日至七日熱不除者必便膿血傷寒厥四日
熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故
為進也

一或寒熱偏有所勝便屬陰陽不相順接之病元
告承制之間與其陽不足而陰有餘毋寧陰不足

陽明四正
寒人于此
日運七日
陽明也

陽氣與故為
地一部傷寒
論之提綱在
此即陰病見
陽脈者生陽
病見陰脈者
死之條口也

而陽有餘也。何以言之。病本於陽。熱多於厥。則陽盛而愈。縱或熱不除。而使膿血。亦必熱鬱之久而後成。故厥應下之法。尚不嫌於遲也。病本於陰。厥多於熱。則陰盛而病進。陰進由於陽退。故烏梅丸一方。必待病進而用之。恐用之已無及也。或且謂烏梅丸主久利。方條中無自利證。胡為用之。不知前條發熱而利必自止。見厥復利已。列出服日矣。豈更贅哉。但陽退病進。此是總結。陰陽兩接大關鍵語。必須互以陽進病退。方為該括。而不互者。意在起下文耳。○條中厥少熱多。厥多熱少。是題中

二眼目合而參之首二條出治方三四條出脉
五六七八條出證九十條出日子欲人彼此互照
凡陽勝而應下者其脉必數必發熱而不下利開
有利者必兼發熱而無汗有汗者必兼發熱利止
而咽疼又必小便短而赤必黑嘿不欲食必煩燥
而兼滿必日子熱多于厥而非平等也凡陰勝而
主烏梅丸者其脉必遲必厥而下利不復發熱又
必小便利而白必欲得食而不能食必不煩燥雖
煩而不兼胸膈滿必日子厥多於熱而不平等也
只為世人將仲景文字逐條看去不復通篇理會

之陰治此條
只索陰平陽
秘不宜以傷
以傷血故為
梅丸外有當
暗四逆傷之
主提不同少
陰之無法也

遂如瞎子摸路。無有者處。即如厥熱一證。逐條取
註。如題起止。縱令字句明晰。然以此條合之。彼條
則。血。而。以。彼。條。合。之。此。條。更。歸。不。知。以。此。臨。病。從
何。着。眼。從。何。着。手。今。予。稍。稍。條。之。敢。不。百。拜。貢。禮。
曰。千。手。千。眼。大。慈。大。悲。張。仲。景。夫。子。哉。世。人。只
言。傳。經。之。厥。為。熱。厥。直。中。之。厥。為。寒。厥。斯。言。謬。甚。
三。陽。之。厥。多。得。于。失。下。此。為。熱。厥。少。陰。之。有。厥。悉
屬。寒。至。于。厥。陰。之。熱。厥。僅。有。傷。寒。一。二。日。至。四。五
日。而。厥。者。一。條。若。熱。少。厥。微。指。頭。寒。一。條。寔。即。此
條。熱。深。厥。亦。深。熱。微。厥。亦。微。之。註。脚。外。是。更。無。發

熱厥證矣。果如傳邪之說。則在四五日固得矣。論中何云一二日至四五日哉。一二日不知何經來傳。而神速且若此。余再爲剖之。論中云陰陽不相順接。便爲厥。此厥字內兼有發熱字在內。當其發熱不復見厥與利。是爲陽勝而陰退。熱也。非寒也。及其變厥而利。不復發熱。是爲陰復而陽退。寒也。非熱也。熱則真熱。寒亦真寒。唯視夫勝復以通爲先後耳。何得稱厥以熱之名哉。唯一二日至四五日而厥一條。其厥自夾發熱而來。且有裏證可驗。與夫單發熱。單厥逆者不同。此孤陽獨勝。不容陰

復之證。比之虬厥一證。爲孤陰獨勝。不容陽復之
證。對待而看。又兩與彼之厥而復熱。熱而復厥者
不同。其曰厥應下之者。下其熱。非下其厥也。此外
遇發熱則可下。遇厥則萬不可下矣。推緣其故。厥
陰與少陽一府一藏。少陽在三陽爲盡。陽盡則陰
生。故有寒熱之往來。厥陰在三陰爲盡。陰盡則陽
接。故有寒熱之勝復。凡遇此證。不必論其來自三
陽。起自厥陰。只論熱與厥之多少。熱多厥少。知爲
陽勝。厥多熱少。知爲陰勝。熱在後而不退。則陽過
勝。過勝而陰不能復。遂有喉痺便血等證。厥在後

而不退。則陰過勝。過勝而陽不能復。遂有除中及
亡陽等死證。所以調停二治法。須合乎陰陽進退
之機。陽勝宜下。須待殘陰退盡。方下之。況小承氣
湯中。業已去芒硝之寒。而有厚朴之溫。在厥陰中。
破陽以行陰。最爲合劑。陰勝宜溫。不待其勝也。縱
有陽邪。一見厥利。便宜烏梅丸。聚辛熱之品。而加
苦寒之佐。在厥陰中。破陰以行陽。雖有上熱。如首
條消渴。氣上撞心等證。亦不慮其扞格也。一則治
之不嫌遲。一則治之務須早。則又扶陽抑陰之微
旨耳。陰證脉沉。一見發熱。總無罷表。在少陰便

傷寒六七日脉微手足厥冷煩燥灸厥陰厥不還者

陽氣退其病爲進陰盛故也陰盛不已而陽亡以陰陽不相順接之病坐令陽亡而死不歷歷指出何以爲警懼也脉微厥冷而煩躁是卽前條中所引蕤厥之證六七日以前無是也今已至是雖欲扶

厥陰以發熱
爲止利此
熱爲陽也
非病氣也
人爭爲

陽無可扶矣。所恃灸厥陰以通其陽。灸而厥不還。陽氣絕也。死而已矣。

傷寒發熱下利厥逆。躁不得臥者死。

發熱而厥還利必止。厥證以此驗陽復也。今既發熱。不但厥利不退。而且躁不得臥。則知孤陽已從熱散矣。易得不死。

傷寒發熱下利至甚。厥不止者死。

不必躁不得臥也。縱無此證。而發熱下利至甚。厥不止者亦死。須步步防有危機。蓋陰竭則陽必散也。

發熱而厥者
可將復至于
下利而厥者
矣

有陰無陽則
是陰陽不相
順接虛脫之
而厥故要修
治以發其陽

發熱而厥七日下利者為難治

熱則不厥發熱而厥陽外陰內已屬內後加之下
利裏氣虛陽益難回矣惜乎何不圖之七日前也
傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死
有陰無陽故也

傷寒六七日雖陰陽未見其勝負然而助陽消陰
之理固之貴早未可以不利爾喜喜也我方持
之以緩彼且乘我以驟便發熱便利便汗出不止
緣從前陽神已為陰盡迄今雖欲從而無陽可復
則其死也不死于陰陽不相順接而死于無陽也

陽有志斯道者可不于扶陽二字日三省云仲景
以此句作結乃篇中之大關鍵今人講死處只將
證候敘述一遍亦何難付死之一字於度外仲景
言外之旨實欲人刻刻置死之一字於膜中余于
仲景傷寒論每讀一篇輒補一題戒嚴自嘆年雖
來不審尚得幾千百焉仲景之材教也○條中以
陰陽不相順接作起句而以有陰無陽作結句乃
一篇之大題目再細研之傷寒先厥後發熱而利
者必自止見厥復利即人心維危道心維微之旨
也烏魯在解不抽出一方即惟精惟一之旨也雖

不在此處
外無不在此
無處無其
有無無其

汗下後利而
然之無其
此處無其
此處無其
此處無其
此處無其

有。下。之。法。而。未。後。則。曰。厥。少。熱。多。其。病。愈。
寒。多。熱。少。陽。氣。衰。為。逆。則。尤。說。厥。中。之。旨。何。莫。
不。存。乎。其。人。哉。讀。仲。景。書。徒。贊。其。奇。徒。贊。其。妙。亦。
只。一。部。好。書。耳。須。于。言。外。得。其。告。誡。之。意。方。知。
論。中。一。字。一。句。莫。非。典。謨。警。誥。之。體。也。

大。汗。若。大。下。利。而。厥。冷。者。四。逆。湯。主。之。

至。若。手。足。厥。冷。之。厥。純。是。陰。寒。用。事。多。從。少。陰。發。
來。與。本。經。陰。陽。不。相。順。接。之。厥。另。是。一。種。不。得。李。
代。桃。僵。也。蓋。少。陰。之。厥。冷。多。得。之。自。中。厥。陰。無。此。
也。必。因。誤。汗。及。誤。下。而。來。其。治。之。之。法。一。準。於。少。

非是
此以無胃氣
證知為不足
厥冷之脈

此雖有發熱
然厥自熱不
去明熱光而
厥後故不在
狂亂

內物見四肢
寒與氣上接

陰而已。如大汗若大下利而厥冷者，因四逆湯湯之之一證也。

大汗出熱不去，內拘急，四肢疼，又下利厥逆而惡寒者，四逆湯主之。

但厥陰之因誤治而成厥冷，其見證亦與陰陽不相順接者不同。彼證見厥利則不汗出，熱必去，即厥熱並見者有之。所云厥深熱亦深，厥微熱亦微是也。然必不下利，更詳其兼證，則有煩燥嘔而胸脇滿諸項。今因大汗後汗雖出而熱不去，熱不開表可知，不唯無煩躁等證，而且內拘急，四肢疼，自

引事之

須知寒之
到以不生

是寒熱殊途矣。以此而見下利厥逆之證。且復邪
寒一團純陰主。今自是四逆湯證。而非烏梅丸證
也。或曰。此症大汗出。熱不去。何為不在亡陽死
證列。曰。亡陽由于寒虛。此證內拘急。四肢疼。而惡
寒。尚兼寒實。寒虛者陰陽脫離。寒實者陽得陰戀。
故可行溫法也。或又曰。子欲剖陰陽不相順接之
證。為烏梅丸證。四肢逆冷之厥。為四逆湯證。誠然。
然乎言之矣。不知先厥未熱之時。何從得真非乎。
足逆冷之厥。屏四逆而用烏梅也。曰。昔賢者條所
揭。消渴氣上。瘧心。心中疼。然。此而。不。後。陰。則。吐。

烏梅丸為胃
寒藥所以之
陰虛者何也
四散胃氣
于水坑而受
濕于陽明也

虬之証。為陰陽不相順接六字下註。即也。彼以
未見厥利。故有下之利不止之戒。其上一句先結一
筆。曰食則吐。虬雖未出方。而備寫出一上熱下寒
之証。則烏梅丸一方已隱隱現在。食則吐。虬句之
前矣。首條示烏梅丸之影。虬厥條乃現烏梅丸之
形。又恐世人祇從形上索摸。不以烏梅丸為主。厥
而徒以烏梅丸為主。虬影反被形遮矣。故又拖一
筆。曰主久利。方蓋虬厥條祇有厥而無利。故也。其
人以此句為總筆。不知仲景復出一條。曰先厥者
發熱而利者。必自止。見厥復利。以後利字。真前

牛○其○是○發○生○矣○後○利○字○既○可○頂○前○則○前○身○之○利○獨○不○可○以○接○後○乎○前○後○互○映○並○不○露○出○揭○證○蓋○以○陰○陽○不○相○順○接○句○作○骨○子○則○首○條○所○揭○之○證○內○已○包○有○厥○利○之○機○而○凡○厥○利○處○皆○具○有○首○條○之○證○仲○景○不○必○言○而○無○不○言○矣○具○首○條○之○證○不○下○利○而○發○熱○則○爲○陽○勝○具○首○條○之○證○不○發○熱○而○厥○利○則○爲○陰○勝○勝○而○復○復○而○勝○總○是○首○條○證○爲○之○胚○胎○也○故○有○首○條○一○二○證○而○發○厥○下○利○者○乃○陰○陽○不○相○順○接○之○厥○利○身○梅○尤○證○也○無○首○條○一○二○證○而○發○厥○下○利○者○雜○證○之○厥○利○非○陰○陽○不○相○順○接○之○厥○利○非○身○

厥陰諸傳云
不可下者何
也上熱下寒
也得云厥陰
下之者何也
陽而遊其
陰上熱下寒
然則用苦寒
陽而遊陰中
者何也陽神
初復時任反
虛寒者何也

梅九證也其于發熱也亦然蓋厥陰以陰藏而主
下焦寒其體也而所司者風所挾者相火熱其用
也體用循環理固如此體則無形用固有象所以
首條所揭者厥陰之用也而體即伏于用之中
下之利不止一語危哉微哉故知易極九一方
厥陰中主方厥應下之以云救耳有所法即有所
禁故于中復夾黃芩湯一方合夫下之利不止發
汗則口傷爛赤是為三禁耳其餘四逆湯而下隨
證隨方以其乘之雜則亦應之雜在厥陰中直附
庸置之故雖下利之證亦復星羅棋布而易極九

陽欲接而不
得接脈促

脈促者熱
在表此脈熱
也此脈促也
此脈出陽脈

則○脈○不○容○假○借○呼○其○脈○乎○

傷○寒○脈○促○手○足○厥○逆○者○可○灸○之○

外○此○而○有○諸○四○逆○諸○厥○之○不○一○其○中○多○有○伏○陽○鬱○
熱○所○致○然○總○屬○厥○陰○主○事○可○以○隨○證○立○法○定○方○而○
脈○不○可○下○也○脈○促○而○厥○此○乃○陰○盛○覆○陽○之○厥○也○灸○
之○使○溫○從○膚○入○則○陽○向○表○宣○故○可○舍○脈○而○治○證○也○

傷○寒○脈○滑○而○厥○者○裡○有○熱○也○白○虎○湯○主○之○

脈○滑○而○厥○此○乃○陽○實○勝○陰○之○厥○也○白○虎○湯○常○能○清○
裏○而○辛○亦○解○表○故○可○舍○證○而○治○脈○也○

病○人○手○足○厥○冷○脈○乍○緊○者○邪○結○在○胸○中○心○下○滿○而○煩○

手足厥冷者
邪氣內阻也
乍前乍後而
不恆往來中
脘一見也此
條與陽微主
證同有同處
須別之以治
湯

厥為主氣本
為寒氣其目
其仲及子所

飢不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

至若手足乍冷其脉乍得緊實者此由陽氣為物
所遏而不得外達以致厥也考其證心下滿而煩
煩因心緒可知飢不能食實不在胃可知以此定
其為邪結在胸中也夫諸陽受氣于胸中胸中被
梗何能復達於四末但須吐以宣之不可下也
傷寒厥而心下悸者宜先治水當與茯苓甘草湯却
治其厥不爾水氣入胃必作利也

此外有寒因水停而作厥者其證以心下悸為驗
厥陰有此多因消渴得之水其本也寒其標也不

經曰營為根
衛為葉言衛
氣微則根葉
枯而葉落保
此近陰虛吐
涎沫必與厥

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利吐膿血泄利不止者為難治麻黃升

麻湯主之

外此更有營衛及脈氣被阻而作厥者如大下後寸脈沉而遲陽神陷裏而上焦之津液固已先傷也兼以手足厥逆胃陽不升中焦弱也下部脈不至腎陰虧乏下焦竭也肺既以胃虛無稟苑而生熱而下部陰亡復不能滋潤肝木以致肝火乘金注肺而成肺痿此三焦悍烈不能營衛再乘之

登則源、登營
血大、源往
乘之、

世多血脈
此亡血之厥
又不問其
病不其於之
分也

方○虞○泄○利○不○止○重○亡○津○液○為○難○治○敢○下○之○乎○青○茶○
麤○冬○清○上○焦○之○熱○姜○本○苓○甘○補○中○焦○之○虛○芍○藥○知○
母○滋○下○焦○之○液○更○佐○麻○升○歸○桂○引○清○涼○之○氣○而○直○
達○乎○營○與○衛○使○在○上○之○燥○氣○一○除○則○水○母○得○源○而○
津○回○降○下○腎○氣○亦○滋○矣○

傷寒五六日不結胸腹滿脈虛復厥者不可下此為
亡血下之死

諸○四○逆○厥○之○不○可○下○者○已○條○而○析○之○矣○更○得○言○夫○
虛○家○亦○然○之○故○傷○寒○五○六○日○外○無○陽○證○內○無○胸○腹○
滿○脈○虛○復○厥○則○虛○寒○二○字○人○人○知○之○誰○復○下○者○誤○

下焦為生氣
之原冷結于
此周身之陽
氣俱無所動
故手足厥冷

在肝虛則燥而有閉證寒能凝血故也故曰此為
亡血下之死

病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此為
結在膀胱關元也

若發厥雖不結胸而小腹滿實作痛結則似不可
下然下焦之結多寒不比上焦之結多熱也况膀胱
關元之處尤為藏室下之發動藏氣害難言矣
益不可也

手足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯主之若其人內
有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

少陰所主者
 氣虛則為寒
 當初大陰以
 經陰所主者
 血虛則為寒
 當溫經散寒
 此大法也
 水中陰經用
 制氣防動氣
 從流下而為
 反故用四升
 桂枝子三三
 陰中升陽
 轉氣下趨少
 腹者肝有疏
 泄之令而動
 及脾也

且血虛停寒不特不可下也。熱亦難用溫。蓋虛寒
 附革之僭而燥也。須以溫經而兼潤燥和胃。如
 益陰為治。故在厥陰經。逢手足厥冷。脈細欲絕者。
 寒虛兼燥為多。當歸四逆湯主之。即此可該亡血
 之治也。內有大寒者。加吳茱萸。薑降而散之。即此可
 該冷結膀胱之治也。
 傷寒四五日。腹中痛。若轉氣下趨少腹者。此欲自利
 也。

若四五日內。不唯不大便。而腹中痛。痛則異于亡
 血家之腹滿。腹中則異于冷結。家之膀胱開。元氣

傷寒論卷之九
辨陽明病下利
下利者不可
下也

為○可○下○矣○不○知○腹○中○少○腹○之○分○虛○而○有○寒○則○木○火○
相○微○不○能○運○轉○水○穀○中○無○之○氣○難○于○轉○動○而○作○
痛○也○待○其○氣○轉○自○當○下○趨○彼○少○腹○之○陰○寒○得○冒○衝○
衝○之○而○腹○滿○自○下○腹○痛○自○除○故○以○為○不○可○下○也○
傷○寒○本○自○寒○下○醫○復○吐○下○之○寒○格○更○逆○吐○下○若○食○入○
口○即○吐○乾○姜○黃○連○黃○芩○人○參○湯○主○之○
前○證○雖○得○之○傷○寒○要○其○人○平○素○下○焦○本○自○寒○也○醫○
不○揣○其○本○見○其○因○五○日○不○自○利○加○之○腹○痛○則○必○不○
能○食○疑○為○關○格○證○吐○而○復○下○之○以○平○素○之○寒○原○格○
於○下○今○更○遭○吐○下○之○逆○治○致○陰○陽○不○相○順○接○下○焦○

之寒未徹而上焦之熱轉升不開格而開格矣食
入口卽吐是有火也改用芩連苦以降上焦之陽
逆姜參溫以補中焦之虛寒胃陽得煖仍可轉氣
而下利一自利吐隨利止矣此轉虛家未發厥而
陰陽不相順接之故得之誤治非屬本病若仍從
多傷丸例酌用此方救誤尚自有法不爾救之無
可救矣何可下也

下利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者
必鬱胃汗出而解病人必微厥所以然者其面微陽
下虛故也

流注之則上
行則不得下
行法得下利
汗出而下利
自山曰下利
故也此少陰
野上其有
下下無利者
可以同治

厥陰經之病最難辨識者無如于厥厥證得其脈
緒外此應無犯手矣然不在厥例者尚有二三證曰
下利曰嘔曰噦更當一一終其說下利脈沉而遲
寒診非虛診也所下者清故裏寒可知面少赤身
有微熱表陽為寒所持鬱不得越可知其解也必
由汗出表鬱故也而其汗也必先鬱胃寒持故也
病人必微厥指未解前言卽鬱胃中之一證裏寒
故厥陽不甚虛故微下虛故也正見虛在下面不
在上所以成戴陽之證虛字當寒字看陽以陰為
根陰中無陽而陽在上故曰戴陽

此汗非陰汗
陽熱在表而
不下通也與
少陰身反不
惡寒同者

脈極寒天矢
法口乾得後
失後不得者

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之
外熱指面赤身微熱言上條出證此條出方唯汗
出而厥句稍不同前證汗出解應均解何得復有
厥證蓋陰寒之所持者重汗雖出而陽不能盡出
也故用四逆加葱於清陰助陽中並通表氣
下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘
者死

前條四逆之加葱者以有沉遲之脈寒則實而陽
不虛故可用耳若下利厥冷而無脈者陽氣盡亡
雖灸法不能保其必溫矣厥不還反微喘者孤陽

天

陽氣衰于脉
脉三息手足
斷無溫理

流性之令處
行有邪性方
是也此止之
者

隨火氣而上脫也洵矣慈根之宜審加也

下利後脉絕手足厥冷昨時脉還手足溫者生脉不

還者死

可見下利陽脫不脫全憑手脉矣之後還不還只

昨時而生死判矣奈何不求生乎早哉

傷寒下利日十餘行脉反實者死

無脉者虛象也然陽脫不必盡見脉虛下利甚脉

反實者真藏之氣獨見胃氣不能與之俱則亦死

下利有微熱而渴脉弱者令自愈

下利脉絕者死脉實者亦死必何如而脉與證合

虛中四時而脈復不元

四

有熱而經中

四二
作陽復以
有熱而經中

也。緣厥陰下利，病陰寒勝，微熱而渴，則陽熱復也。肝弱知邪已退，而經氣虛耳，故令自愈。下利，脈數而渴者，令自愈，設不差，必清膿血，以有熱故也。

脈數而渴，陽勝陰矣。亦令自愈，若不差，則陰虛熱甚。經云：脈數不解，而下利不止，必協熱而便膿血是也。

下利，脈數，有微熱，汗出，令自愈。設復緊，為未解。下利，脈數，寒邪已化熱也。微熱而汗出，邪從熱化，以出表，故令自愈。設復緊者，未盡之邪復入於裏。

經傳初復之
氣未得過中
故陽入內故
寒邪再集

四三

陽盛陰虛通
成其榮

陰經不應見
浮脈故云反

四四

木宜下沉沉
之太過則見
是微弱并下
氣如經之脈
故微弱之脈

陰○之○下○故○為○未○解○蓋○陰○病○得○陽○則○解○故○數○與○氣○可○
以○定○愈○不○愈○即○陰○陽○勝○復○之○下○利○亦○當○以○此○脉○斷○
下○利○寸○脉○反○浮○數○尺○中○自○濇○者○必○圓○膿○血○
浮○數○者○陽○盛○濇○者○陰○虛○陰○虛○而○陽○下○決○必○隨○經○而○
圓○膿○血○

下○利○脉○沉○弦○者○下○重○也○脉○大○者○為○未○止○脉○微○弱○數○者○
為○欲○自○止○雖○發○熱○不○死○

下○利○脉○沉○弦○者○此○名○陰○也○沉○為○在○裏○弦○為○拘○急○木○
氣○下○沉○而○水○為○之○吸○則○乖○其○潤○下○之○性○而○欠○流○利○
故○為○下○重○即○滯○下○證○也○大○即○沉○弦○中○之○大○木○勢○左○

為腎水通於
不難發熱

汗創所
必耗及
而外
內

盛也。微弱數。即沉。絛中之微弱數。木和既殺而陰
從陽化也。日不死者。與陰病身熱。過汗而亡陽。
殊議也。反而言之。脉大身熱者。死可知矣。

下利清穀。不可攻表。汗出必脹滿。

下利之脉法。詳哉其言之矣。治則云何。下利清穀。
此為裏虛。反攻其表。則汗出而陽從外洩。而陰得
內填。脹滿所由來也。

下利腹脹滿。身憊疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏

宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。

下利不可攻表。微開命矣。兼有表證。則云何。腹脹

熱利下重者白頭翁湯主之
四百七

四百七

清者裏寒也身疼痛者表滯也先裏後表治例不殊太陽也

熱利下重者白頭翁湯主之

治寒利之法厥證中詳之矣厥陰多熱利治則云何熱利則下重肝氣不行傷氣而氣滯也白頭翁湯主之熱滯則腸堅異乎少陰之四逆散矣

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之

熱利則飲水邪熱耗其津液也白頭翁湯主之熱則津回異乎少陰自利而渴之為下焦寒矣

下利微語者有燥屎也宜小承氣湯

熱下重者白頭翁湯主之
四百八

四百八

肝氣通於心
利其氣則心
不得聚散者
此

經曰：厥陰之
止，爲無咎。之

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也宜梔子豉湯
熱利則煩得之利後而心下不硬此爲虛煩餘熱
乘虛而客于胸中也宜梔子豉湯胸中之邪厥陰
無異于太陽也

咽而發熱者小柴胡湯主之。

宅在厥陰是爲衆邪上逆從陽則宜從陰則逆何

中見少陽
經而發熱
手少陽經

四百
五二

正為三合
病治于有陰
無陽也

王陽

謂從陽虛而發熱是也此厥陰傳少陽也故用小
柴胡湯從少陽治

主之
嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯

何謂從陰嘔而脈弱厥陰虛也小便復利少陰寒
也上不納而下不固陽氣衰微可知更身微熱而
見厥則其寒逼微陽而欲越故為難治此從少陰
移來故用四逆湯從少陰治

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

至若厥陰本經之聖則為乾嘔寒在厥陰只兩

不外行故不
見其變

四
五

寒生獨而滿
在胃故有此
受之生也
而後受先
而後有也
醫者各異

嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈

陰之經而見吐涎沫者是厥陰之脈挾胃繫咽
來剋也頭痛者厥陰之經氣上類陰寒逆上也吳
黃佐生薑而辛散則頭痛可已人參佐大棗而溫
補則吐沫可蠲添薪接火火升而才自降之治也
嘔與沫之家若見癰膿此非肺熱之比乃前時失
溫以致寒邪與津液搏結而成不可治其癰膿由
膿結膿即沫成只此吳茱萸湯辛溫補散嘔膿自
盡而愈不知此而改用辛涼一便利於下而津液
枯於上不可為矣

傷寒大吐大下之極虛後極汗出者以其人外氣微
鮮復與之水以發其汗因得嘔所以然者胃中寒冷
故也

噦之一證則亦有虛有實虛自胃冷得之繼大吐
大下後陰虛而陽無所附因見面赤以不能得汗
而外氣拂鬱也醫以面赤爲熱氣拂鬱復與水而
發汗令大出殊不知陽從外洩而胃虛水從內搏
而寒格胃氣虛竭矣安得不噦點出胃中寒冷字
是亦吳茱萸湯之治也

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

五言

實自下集壅閉衛氣道上得之木不能沉而上阻
故後而腹滿前部不利者衛氣與木搏後部不利
者衛氣與火搏也視前後二便而疏泄之水與火
兩無所得而衛氣歸元矣

五言

厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲未愈
浮則木氣外達而風并上行厥氣得陽而自解矣
不浮爲未愈太少內須俱互有此句

厥陰病欲解時從丑至卯上

丑中既有土氣而寅卯且得木旺而乘陽也